



СТОВЕК

ветеринарное производство



Антибактериальные порошки

АМОКЛАВ амоксициллин 50%, клавулановая кислота 12,5%	●	●				4
АМОКОЛ 50 амоксициллин 50%, колистин 4 млн МЕ/г	●	●	●			4
АМОКСИЦИЛЛИН 80-ТРВ амоксициллин 80%	●	●	●			4
ДОКСИГИЛ 50 доксициклин 50%	●	●	●			4
ДОКСИТИЛ доксициклин 10%, тилозин 10%	●	●	●			5
ДОКСИФИД доксициклин 10%		●				5
КОЛИ 12-ТРВ колистин 12 млн МЕ/г	●	●	●		●	5
NEW ЛЕКСОФИД-ТРВ левофлоксацин 15%	●	●				5
НОЗИГЕПТИД 1%-ТРВ нозигептид 1%	●	●	●			6
NEW НОЗИМИЦИН ТРВ нозигептид 1%, китасамицин 5%	●	●				6
NEW ПАРОФИД 20%-ТРВ паромомицин 20%	●	●	●			6
ТЕТРАФИД ТРВ хлортетрациклин 20%, тиамулин 5%		●				6
NEW ТИАКОЛ-ТРВ тиамулин 45%, колистин 1 200 000 МЕ/г	●	●				7
NEW ТИАМУЛИН 45%-ТРВ тиамулин 45%	●	●				7
ТИАМУЛИН 80-ТРВ тиамулин 80%		●				7
NEW ТИЛМОФИД-ТРВ тилмикозин 20%		●				7
ТИЛТАР 80 тилозин 80%	●	●				8
NEW ФЛОРФИД 4%-ТРВ флорфеникол 4%	●	●	●			8
NEW ЦИПРОФИД-ТРВ ципрофлоксацин 10%		●				8

Кокцидиостатики

САЛИНОМИЦИН 12-ТРВ салиномицин 12%	●	●	●		●	8
--------------------------------------	---	---	---	--	---	---

Антибактериальные оральные растворы

КОЛИСТИН АКВА колистин 4 млн МЕ/мл	●	●	●			9
ЛЕКСОЛ АКВА левофлоксацин 15%	●	●				9
ЛЕСТИН АКВА левофлоксацин 10% колистин 1 млн МЕ/мл	●	●				9
СУЛЬФАПРИМ АКВА-ТРВ сульфадимидин 20% триметоприм 4%	●	●	●			9
ТЕТРАФЛОКС АКВА тилмикозин 5%, левофлоксацин 2,5% триметоприм 2,5%	●	●				10
ТИЛМИКОЗИН 30% АКВА-ТРВ тилмикозин 30%	●	●	●			10
ТИЛОЗИН АКВА тилозин 20%	●	●				10
ТРИЭНРОКОЛ АКВА энрофлоксацин 10%, триметоприм 5%, колистин 1 млн МЕ/мл	●	●	●			10
ФЛОРОЛ 10% АКВА-ТРВ флорфеникол 10%	●	●				11
ЦИПРОФЛОКСАЦИН АКВА ципрофлоксацин 20%	●	●				11
ЭНРОГЕНТ АКВА-ТРВ энрофлоксацин 10% гентамицин 5%	●	●				11
ЭНРОМОЛ АКВА-ТРВ энрофлоксацин 10% колистин 2 млн МЕ/мл	●	●	●		●	11
ЭНРОФЛОКСАЦИН 20% АКВА-ТРВ энрофлоксацин 20%	●	●	●			12

Антибактериальные инъекционные препараты

АЗИТРОМИЦИН 10%-ТРВ азитромицин 10%		●	●		●	12
АМОКСИДЖЕКТ LA амоксициллин 15%		●	●			12
ЛЕКСОДЖЕКТ левофлоксацин 15%		●	●		●	12



Антибактериальные инъекционные препараты

NEW	МАКРОДЖЕКТ тилдипирозин 4%		●	●			13
	МОКСИДЖЕКТ LA-TPB моксифлоксацин 10%		●	●			13
	ОКСИКЕТ-TPB окситетрациклин 20%, кетопрофен 3%		●	●		●	13
	ОКСИТЕТРАЦИКЛИН 200 LA-TPB окситетрациклин 20%		●	●		●	13
	ПЕНСТРЕП LA-TPB бензилпенициллин прокаин 10% бензилпенициллин бензатин 10% дигидрострептомицин сульфат 20%		●	●		●	14
	ТИЛДЖЕКТ тилозин 20%		●	●		●	14
	ТУЛАТРОМИЦИН 10-TPB тулатромицин 10%		●	●			14
	ФЛОРЕЗОЛ флорфеникол 40%		●	●		●	14
	ЦЕФТИДЖЕКТ LA-TPB цефтиофур 10%	●	●	●		●	15
	ЭНРОДЖЕКТ LA-TPB энрофлоксацин 10%		●	●		●	15

Витаминно-минеральные препараты

NEW	БУТАДЖЕКТ 10%-TPB бутафосфан 10% цианокобаламин 0,005%		●	●	●	●	15
	ЖЕЛЕЗО 20/В12-TPB декстран железа 20% витамин В ₁₂ 0,02%		●	●			15

Гормональные инъекционные растворы

	ДЕКСА-TPB дексаметазон 0,4%		●	●	●		16
--	-------------------------------	--	---	---	---	--	----

Противопаразитарные препараты

	ИВЕРМЕКТИН 1%-TPB ивермектин 1%		●	●		●	16
	ИВЕРМЕКТИН АКВА ивермектин 4%	●	●	●		●	16

Противовоспалительные нестероидные препараты

	КЕТОПРОФЕН 10-TPB кетопрофен 10%		●	●	●		16
NEW	МЕЛОКСИДЖЕКТ 2%-TPB мелоксикам 2%		●	●	●	●	17

Противовирусные препараты

	ТРИВИРОН ФОРТЕ-TPB искусственно синтезированная рибонуклеаза	●	●	●			17
	ТРИВИДЖЕКТ 5%-TPB искусственно синтезированная рибонуклеаза		●	●			17

Пробиотические кормовые добавки

	ПРОВАГЕН® B.subtilis, B.licheniformis 10 ⁹ КОЕ/г	●	●	●	●		17
	ПРОВАГЕН КОНЦЕНТРАТ® бацилус субтилис + бацилус лихениформис 10 ¹¹ КОЕ в 1 грамме продукта (флакон 10 грамм)	●	●	●	●		18
NEW	ТРИОБАКТ B.licheniformis 5x10 ⁹ КОЕ/г	●	●				18

Антистрессовый комплекс

	АНТИСТРЕСС жир и водорастворимые витамины, аминокислоты, органические кислоты, микро и макроэлементы	●	●	●			18
--	---	---	---	---	--	--	----

Подкислитель

NEW	АЦИМАКС формиат кальция 35%, цитрат кальция 10%, пропионат кальция 14%, бензойная кислота 9%, лактат кальция 1%, сорбиновая кислота 1%, ацетат натрия 1%	●	●				18
-----	---	---	---	--	--	--	----

Кормовые добавки

NEW	ГЕПАВИТ АКВА L-карнитин 5%, бетаин 1,5%, магний 2%, витамины гр. В	●	●	●	●	●	19
NEW	ОИЛСИД АКВА органические кислоты, тимол, эвгенол	●	●				19

Биодеструктор навоза и помёта

	БИОСАНВИТ-М бактерии рода бацилус (бацилус лихениформис, бацилус паралихениформис, бацилус сн) 10 ⁷ КОЕ в 1 грамме продукта	●	●	●			19
--	--	---	---	---	--	--	----

Биоактиватор навоза и помёта

	БИОСАНВИТ-С бактерии рода бацилус (бацилус лихениформис, бацилус паралихениформис, бацилус сн) 10 ⁸ КОЕ в 1 грамме продукта	●	●	●			19
--	--	---	---	---	--	--	----

АМОКЛАВ

AMOCCLAV

амоксциллин 50%
клавулановая кислота 12,5%



Применение:

колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез и другие инфекции желудочно-кишечного, респираторного тракта, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

- Птица - 50 -100 г/т воды
- Свиньи - 0,4 -1 г/50 кг массы тела

АМОКОЛ 50

AMOCOL 50

амоксциллин 50%
колистин 4 млн МЕ/г



Применение:

колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, гемофилез, рожа свиней и другие заболевания бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к амоксициллину и колистину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

- Птица - 300 г/т воды
- Свиньи - 3 г/100 кг массы тела
- КРС - 3 г/ 100 кг массы тела

АМОКСИЦИЛЛИН 80-ТРВ

AMOXICILLINUM 80-TRV

амоксциллин 80%



Применение:

колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, гемофилез, клостридиоз, рожа свиней и другие заболевания бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к амоксициллину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

- Птица - 100-250 г/т воды
- Свиньи - 100-200 г/т воды
- Телята - 15-30 мг/ 1 кг массы тела

ДОКСИГИЛ 50

DOXYGILUM 50

доксциклин 50%



Применение:

колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, микоплазмоз и другие инфекционные заболевания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к доксициклину.

Применяют перорально в течение 3-6 дней

Дозировки:

- Птица - 200-400 г/т воды
- Свиньи - 200 г/т воды
- Телята - 0,1 г/10 кг массы тела

ДОКСИТИЛ

DOXYTILUM

доксциклин 10%
тилозин 10%



Применение:

колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, гемофилез, микоплазмоз и другие инфекционные заболевания, вызванные микроорганизмами, чувствительными к доксициклину и тилозину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

-  Птица - 0,5-1 кг/т воды
-  Свины - 0,5-1 кг/т воды
-  Телята - 5 г/100 кг массы тела

ДОКСИФИД

DOXYFIDUM

доксциклин 10%



Применение:

колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, микоплазмоз и другие инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к препаратам тетрациклинового ряда.

Применяют перорально в течение 5-7 дней

Дозировки:

-  Свины - 2,5 кг/т корма

КОЛИ 12-ТРВ

COLI 12-TRV

колистин 12 млн МЕ/г



Применение:

колибактериоз, сальмонеллез и другие инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к колистину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

-  Птица - 50-180 г/т воды
-  Свины - 5-8 мг/кг массы тела
-  КРС, МРС - 5-8 мг/кг массы тела

ЛЕКСОФИД-ТРВ

LEXOFIDUM-TRV

левофлоксацин 15%



Применение:

при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, микоплазмозе, синдроме ММА, а также при других болезнях органов дыхания, пищеварительной и мочеполовой системы, возбудители которых чувствительны к левофлоксацину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

-  Птица - 0,35-0,5 кг/т воды
0,5-1 кг/т корма
-  Свины - 0,35-0,5 кг/т воды
0,7-1 кг/т корма

НОЗИГЕПТИД 1%-ТРВ

NOSIHEPTIDIUM 1%-TRV

нозигептид 1%



Применение:

применяют групповым методом в смеси с кормом в течение 14 дней в следующих дозах:

Дозировки:

- Молодняк сельскохозяйственной птицы - 250 г/т корма; куры-несушки - 200-250 г/т корма
- Подсосные поросята, поросята на доразивании, свиньи на откорме, основные свиноматки и хряки, супоросные, лактирующие свиноматки - 300-1000 г/т корма
- Телята - 300-500 г/т корма

НОЗИМИЦИН ТРВ

NOSIMICINUM TRV

нозигептид 1% китасамицин 5%



Применение:

при клостридиозе, эширихиозе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе и других заразных болезнях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата. Применяют групповым методом в течение 14 дней

Дозировки:

- Птица - 200-300 г/т корма
- Свиньи - 350-700 г/т корма

ПАРОФИД 20%-ТРВ

PAROFIDUM 20%-TRV

паромомицин 20%



Применение:

при болезнях желудочно-кишечного тракта бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к паромомицину, в том числе эширихиоз, сальмонеллез.

Препарат задают внутрь в течение 3-5 дней в следующих дозах:

Дозировки:

- Птица - 0,5-1,5 кг/1000 кг корма или 0,25-0,75 кг/1000 литров воды
- Свиньи - 2,2-5 кг/1000 кг корма или 1-2,5 кг/1000 литров воды
- Телята - 1,25-2,5 г/10 кг массы тела

ТЕТРАФИД ТРВ

TETRAFID-TRV

хлортетрациклин 20% тиамулин 5%



Применение:

при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной и микоплазменной этиологии, а также при других болезнях, вызванных ассоциацией микроорганизмов, чувствительных к комбинации хлортетрациклина и тиамулина.

Применяют перорально в течение 5 дней

Дозировки:

- Свиньи - 200-400 г/100 кг корма

ТИАКОЛ-ТРВ

TIACOLUM-TRV

тиамулин 45%
колистин 1 200 000 МЕ/г



Применение:

стафилококкоз, стрептококкоз, листериоз, колибактериоз, сальмонеллез, клебсиеллез, микоплазмоз, энзоотическая пневмония, дизентерия и рожа свиней, а также при других инфекциях, возбудители которых чувствительны к тиамулину и колистину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

- Птица - 250-500 г/т воды или корма
- Свиньи - 200 -450 г/т воды или корма

ТИАМУЛИН 45%-ТРВ

TIAMULINUM 45%-TRV

тиамулин 45%



Применение:

стафилококкоз, стрептококкоз, листериоз, клебсиеллез, микоплазмоз, хламидиоз, боррелиоз, энзоотическая пневмония, дизентерия и рожа свиней, а также при других инфекционных болезнях, возбудители которых чувствительны к тиамулину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

- Птица - 300-500 г/т воды
- 200-450 г/т корма или 150-200 г/т воды

ТИАМУЛИН 80-ТРВ

TIAMULINUM 80-TRV

тиамулин 80%



Применение:

дизентерия, энзоотическая пневмония, актинобактериальная плевропневмония, пролиферативная энтеропатия и кишечный спирохетоз и другие бактериальные инфекции, возбудители которых чувствительны к тиамулину.

Применяют перорально в течение 3-14 дней

Дозировки:

- Свиньи - 0,125-0,25 кг/т корма (5-10 мг тиамулина/кг массы тела)
- 0,08-0,1 кг/т воды

ТИЛМОФИД-ТРВ

TILMOFIDUM-TRV

тилмикозин 20%



Применение:

применяют для лечения свиней при болезнях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к тилмикозину возбудителями.

Препарат задают свиньям внутрь в течение 3-14 дней

Дозировки:

- Свиньи - 1-2 кг/т корма
- 1 кг/т воды

Антибактериальные порошки

ТИЛТАР 80

TILTARUM 80

тилозин 80%

Применение:

респираторный микоплазмоз кур, инфекционный синусит индеек, дизентерия свиней, гастроэнтероколиты бактериальной этиологии и другие бактериальные инфекции, возбудители которых чувствительны к тилозину.

Применяют перорально в течение 3-7 дней

Дозировки:

-  Птица - 0,5 кг/т воды
-  Свиньи - 0,25 кг/т воды



ФЛОРФИД 4%-ТРВ

FLORFIDUM 4%-TRV

флорфеникол 4%

Применение:

применяют при стафилококкозе, стрептококкозе, колибактериозе, сальмонеллезе, микоплазмозе, а также при других инфекционных болезнях, возбудители которых чувствительны к флорфениколу.

Препарат задают перорально в течение 3-7 дней

Дозировки:

-  Птица - 0,5-1 кг/т корма
-  Свиньи - 0,5-1 кг/т корма
-  КРС - 0,5-1 кг/т корма



Антибактериальные порошки

ЦИПРОФИД-ТРВ

CIPROFIDUM-TRV

ципрофлоксацин 10%

Применение:

для лечения свиней при болезнях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к ципрофлоксацину возбудителями применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

-  Свиньи - 0,25-0,35 кг/т воды
0,75 кг/т корма



Кокцидиостатики

САЛИНОМИЦИН 12-ТРВ

SALINOMYCIN 12-TRV

салиномицин 12%

Применение:

при кокцидиозе цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка кур; молодняка крупного рогатого скота и овец; свиней, вызванных различными видами эймерий.

Применяют перорально

Дозировки:


-  Птица - 500 г/т корма
-  Свиньи - 250-450 г/т корма
-  КРС, МРС - 100-250 г/т корма



КОЛИСТИН АКВА

COLISTINUM AQUA

колистин 4 млн МЕ/мл



Применение:

инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, возбудители которых чувствительны к колистину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней


Дозировки:

- Птица - 100-125 мл/т воды
- Свины - 0,25-0,5 л/т воды
- КРС - 0,01-0,025 мл/1 кг живой массы

ЛЕКСОЛ АКВА

LEXOLUM AQUA

левофлоксацин 15%



Применение:

при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, псевдомонозе, микоплазмозе, гемофилезе, синдроме ММА; при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к левофлоксацину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней


Дозировки:

- Птица - 0,35-0,5 л/т воды
- Свины - 0,35-0,5 л/т воды

ЛЕСТИН АКВА

LESTINUM AQUA-TRV

**левофлоксацин 10%
колистин 1 000 000 МЕ**



Применение:

применяют при бактериальных инфекциях, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

- Птица - 0,4-0,5 л/т воды
- Свины - 0,35 л/т воды

СУЛЬФАПРИМ АКВА-ТРВ

SULFAPRIMUM AQUA-TRV

**сульфадимидин 20%
триметоприм 4%**



Применение:

при заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

- Птица - 0,25-1 л/т воды
- Свины - 0,5-1 л/т воды
- Телята - 1-2 мл/16 кг массы тела

ТЕТРАФЛОКС АКВА

TETRAFLOXUM AQUA

тилмикозин 5%
левофлоксацин 2,5%
триметоприм 2,5%



Применение:

применяют для лечения заболеваний, вызванных микроорганизмами, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

Птица - 1 - 2 л/т воды

Свиньи - 1 - 2 л/т воды

ТИЛМИКОЗИН 30% АКВА-ТРВ

TILMICOSIN 30% AQUA-TRV

ТИЛМИКОЗИН 30%



Применение:

в качестве лечебного средства при микоплазмозе, респираторных болезнях, при других заболеваниях животных, возбудители которых чувствительны к тилмикозину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

Птица - 250 мл/т воды

Свиньи - 500-700 мл/т воды

Телята - 0,04 мл/кг массы тела

ТИЛОЗИН АКВА

TYLOSIN AQUA

ТИЛОЗИН 20%



Применение:

гастроэнтероколиты бактериальной этиологии, дизентерия, колибактериоз, пастереллез; другие заболевания, возбудители которых чувствительны к тилозину.

Применяют перорально в течение 3-7 дней

Дозировки:


Птица - 2-3 л препарата/т воды

Свиньи - 1,15 л препарата/т воды

ТРИЭНРОКОЛ АКВА

TRIENROCOLUM AQUA

энрофлоксацин 10%
триметоприм 5%
колистин 1 млн МЕ/мл



Применение:

респираторные и желудочно-кишечные инфекции бактериальной этиологии, вызванные микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину, триметоприму, колистину и их комбинациям.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

Птица - 0,5 л/т воды

Свиньи - 0,33 л/т воды

Телята - 0,25 - 0,5 мл/10 кг массы тела

ФЛОРОЛ 10% АКВА-ТРВ

FLOROLUM 10% AQUA-TRV

флорфеникол 10%



Применение:

колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез; другие инфекционные заболевания, вызванные микроорганизмами чувствительными к флорфениколу. Применяют перорально в течение 3-7 дней

Дозировки:

Птица - 1 - 2 л/т воды

Свины - 5 мл/100 кг массы тела

ЦИПРОФЛОКСАЦИН АКВА

CIPROFLOXACINUM AQUA

ципрофлоксацин 20%



Применение:

при заболеваниях желудочно-кишечного и респираторного тракта (колибактериозе, пастереллезе) и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к ципрофлоксацину. Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

Птица - 250-330 мл/т воды

Свины - 250-330 мл/т воды

ЭНРОГЕНТ АКВА-ТРВ

ENROGENTUM AQUA-TRV

**энрофлоксацин 10%
гентамицин 5%**



Применение:

при инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

Птица - 0,5 - 1 л/т воды

Свины - 0,5 - 1 л/т воды

ЭНРОМОЛ АКВА-ТРВ

ENROMOL AQUA-TRV

**энрофлоксацин 10%
колистин 2 млн МЕ/мл**



Применение:

респираторные и желудочно-кишечные инфекции бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину и колистину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

Птица - 0,5 - 1 л/т воды

Свины - 0,5 л/т воды

Телята - 0,025 - 0,05 мл/кг массы тела

МРС - 0,025 - 0,05 мл/кг массы тела

Антибактериальные оральные растворы

ЭНРОФЛОКСАЦИН 20% АКВА-ТРВ

ENROFLOXACIN 20% AQUA-TRV

энрофлоксацин 20%



Применение:

при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину.

Применяют перорально в течение 3-5 дней

Дозировки:

-  Птица - 0,25-0,5 л/т воды
-  Свиньи - 1,25-2,5 мл/100 кг массы тела
-  Телята - 1,25-2,5 мл/100 кг массы тела

Антибактериальные инъекционные препараты

АЗИТРОМИЦИН 10%-ТРВ

AZITHROMYCIN 10%-TRV

азитромицин 10%



Применение:

бактериальные инфекции, вызываемые микроорганизмами, чувствительными к азитромицину.

Применяют внутримышечно в течение 2-х дней

Дозировки:

-  Свиньи - 1 мл/20 кг массы тела
-  КРС - 1 мл/20-40 кг массы тела
-  МРС - 1 мл/20 кг массы тела

Антибактериальные инъекционные препараты

АМОКСИДЖЕКТ LA

AMOXIDGESTUM LA

амоксциллин 15%



Применение:

инфекционные болезни желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и мочеполовой системы; хирургические болезни; болезни кожи и мягких тканей.

Применяют подкожно или внутримышечно

Дозировки:

-  Свиньи - 1 мл/10 кг массы тела
-  КРС - 1 мл/10 кг массы тела

ЛЕКСОДЖЕКТ

LEXODGESTUM

левофлоксацин 15%



Применение:

при смешанных и вторичных бактериальных инфекциях, инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к левофлоксацину.

Применяют внутримышечно в течение 3-5 дней

Дозировки:

-  Свиньи - 1 мл/30 кг массы тела
-  КРС - 1 мл/30 кг массы тела
-  МРС - 1 мл/30 кг массы тела

МАКРОДЖЕКТ

MACRODJECTUM

тилдипирозин 4%



Применение:

препарат применяют для лечения свиней и молодняка крупного рогатого скота при заразных болезнях бактериальной этиологии, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к тилдипирозину.

Применяют внутримышечно или подкожно, однократно

Дозировки:

Свиньи - 1 мл/10 кг массы тела

Телята - 1 мл/10 кг массы тела

МОКСИДЖЕКТ LA-TPB

MOXIDJECTUM LA-TRV

моксифлоксацин 10%



Применение:

при бактериальных инфекциях органов дыхания, пищеварительной, мочеполовой системы, мягких тканей; инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к моксифлоксацину.

Препарат вводят однократно внутримышечно

Дозировки:

Свиньи - 1 мл/10 кг массы тела

КРС - 1 мл/10 кг массы тела

ОКСИКЕТ-ТРВ

OXSICET-TRV

окситетрациклин 20%
кетопрофен 3%



Применение:

бронхопневмония, бактериальный энтерит, лептоспироз, рожа, сочетанные инфекции, вторичные бактериальные инфекции.

Применяют внутримышечно или подкожно

Дозировки:

Свиньи - 1 мл/10 кг массы тела

КРС - 1 мл/10 кг массы тела

МРС - 1 мл/10 кг массы тела

ОКСИТЕТРАЦИКЛИН 200 LA-TPB

OXYTETRACYCLINUM 200 LA-TRV

окситетрациклин 20%



Применение:

для лечения инфекционных заболеваний, вызванных чувствительными к окситетрациклину возбудителями.

Применяют внутримышечно, однократно

Дозировки:

Свиньи - 1 мл/10 кг массы тела

КРС - 1 мл/10 кг массы тела

МРС - 1 мл/10 кг массы тела

ПЕНСТРЕП LA-TPB

бензилпенициллин прокаин 10%
бензилпенициллин бензатин 10%
дигидрострептомицин сульфат 20%



Применение:

при заболеваниях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, атрофическом рините и других бактериальных болезнях. Применяют внутримышечно или подкожно, однократно

Дозировки:

- Свиньи - 0,5-1 мл/10 кг массы тела
- КРС - 0,5-1 мл/10 кг массы тела
- МРС - 0,5-1 мл/10 кг массы тела

ТИЛДЖЕКТ

TYLDGEKTUM

тилозин 20%



Применение:

бронхопневмония, маститы, артриты, дизентерия, вторичные бактериальные заболевания, возбудители которых чувствительны к тилозину. Применяют внутримышечно в течение 3-5 дней

Дозировки:

- Свиньи - 0,05 мл/кг массы тела
- КРС - 0,025 - 0,05 мл /кг массы тела
- МРС - 0,05 - 0,06 мл/кг массы тела

ТУЛАТРОМИЦИН 10-TPB

TULATHROMICINUM 10-TRV

тулатромицин 10%



Применение:

для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, вызываемых микроорганизмами чувствительными к тулатромицину.

Применяют внутримышечно или подкожно

Дозировки:

- Свиньи - 1 мл/40 кг массы тела
- КРС - 1 мл/40 кг массы тела

ФЛОРЕЗОЛ

FLOREZOL

флорфеникол 40%



Применение:

инфекционные заболевания бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к флорфениколу.

Применяют внутримышечно и подкожно

Дозировки:

- Свиньи - 0,75 мл/20 кг массы тела
- КРС - 0,75-1,5 мл/15 кг массы тела
- МРС - 0,75-1,5 мл/15 кг массы тела

Антибактериальные инъекционные препараты

ЦЕФТИДЖЕКТ LA-TRV

CEFTIDJECTUM LA-TRV

цефтиофур 10%



Применение:

при инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к цефтиофуру.

Применяют однократно, подкожно или внутримышечно

Дозировки:

- Птица - 0,05 - 0,2 мл/10 кг массы тела
- Свиньи - 1 мл/20 кг массы тела
- КРС, МРС - 1мл/15 кг массы тела

ЭНРОДЖЕКТ LA-TRV

ENRODJECTUM LA-TRV

энрофлоксацин 10%



Применение:

колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, микоплазмоз, синдром ММА и другие инфекционные заболевания, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину. Применяют внутримышечно и подкожно, однократно

Дозировки:

- Свиньи - 7,5-12,5 мл/100 кг массы тела
- КРС - 7,5-12,5 мл/100 кг массы тела
- МРС - 7,5-12,5 мл/100 кг массы тела

Витаминно-минеральные препараты

БУТАДЖЕКТ 10%-ТРВ

BUTADJECTUM 10%-TRV

бутафосфан 10% цианокобаламин 0,005%



Применение:

применяют при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства. Дозы препарата (на одно животное)

Дозировки:

- КРС - 5-25 мл
- Лошади - 5-25 мл
- Свиньи - 1-10 мл
- МРС - 1,5-8 мл
- плотоядные животные - 0,5-5 мл

ЖЕЛЕЗО 20/В12-ТРВ

Ferrum 20/B12-TRV

декстран железа 20% витамин В₁₂ 0,02%



Применение:

применяют с лечебной и профилактической целью, вводят однократно, внутримышечно или подкожно в дозах:

Дозировки:

- Свиньи - 1-5 мл
- КРС - 2-10 мл

Гормональные препараты

ДЕКСА-ТРВ

DECSA-TRV



дексаметазон 0,4%

Применение:

в качестве противовоспалительного, противоаллергического, противоотечного средства при лечении посттравматических отеков, артритов.

Применяют однократно, внутримышечно

Дозировки:

-  Свиньи - 0,15-0,3 мл/10 кг массы тела
-  КРС - 4-9 мл/500 кг массы тела
-  Лошади - 4-9 мл/500 кг массы тела

Противопаразитарные препараты

ИВЕРМЕКТИН АКВА

IVERMECTINUM AQUA



ивермектин 4%

Применение:

применяют для профилактики и лечения при нематодозах, арахно-энтомозах и других паразитарных заболеваниях

Применяют перорально

Дозировки:

-  Птица - 100 мл/т воды
-  Свиньи - 1 мл/100 кг массы тела
-  КРС - 0,25 мл/50 кг массы тела
-  МРС - 0,25 мл/50 кг массы тела

Противопаразитарные препараты

ИВЕРМЕКТИН 1%-ТРВ

IVERMECTINUM 1%-TRV



ивермектин 1%

Применение:

при диктиокаулезе, трихоцефалезе, гиподерматозе, саркоптозе, аскаридозе и других паразитарных заболеваниях.

Применяют внутримышечно или подкожно

Дозировки:

-  Свиньи - 1 мл/33 кг массы тела
-  КРС - 1 мл/50 кг массы тела
-  МРС - 1 мл/50 кг массы тела

Противовоспалительные нестероидные препараты

КЕТОПРОФЕН 10-ТРВ

KETOPROFENUM 10-TRV



кетопрофен 10%

Применение:

противовоспалительное, анальгетическое и жаропонижающее средство.

Применяют внутримышечно или внутривенно, 1-5 дней

Дозировки:

-  Свиньи - 3 мл/100 кг массы тела
-  КРС - 3 мл/100 кг массы тела
-  Лошади - 1 мл/45 кг массы тела

Противовоспалительные нестероидные препараты

МЕЛОКСИДЖЕКТ 2%-ТРВ

MELOXIDJECTUM 2%-TRV

мелоксикам 2%



Применение:

противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее средство.

Применяют внутримышечно или подкожно

Дозировки:

- Свиньи - 0,2 мл/10 кг массы тела
- КРС - 2,5 мл/100 кг массы тела
- МРС - 2,5 мл/100 кг массы тела
- Лошади - 3 мл/100 кг массы тела

Противовирусные препараты

ТРИВИРОН ФОРТЕ-ТРВ

TRIVIRON FORTE-TRV

искусственно синтезированная рибонуклеаза



Применение:

противовирусное средство для борьбы с инфекциями сельскохозяйственных животных, вызываемыми РНК-содержащими вирусами.

Применяют орально

Дозировки:

- Птица - 0,00125-0,005 мл /кг ж.м.
- Свиньи - 0,05-0,1 мл/кг ж.м.
- КРС - 0,05-0,1 мл/кг ж.м.

Противовирусные препараты

ТРИВИДЖЕКТ 5%-ТРВ

TRIVIDGEKTUM 5%-TRV

искусственно синтезированная рибонуклеаза



Применение:

противовирусное средство для борьбы с инфекциями сельскохозяйственных животных, вызываемыми РНК-содержащими вирусами.

Применяют внутримышечно

Дозировки:

- Свиньи - 0,1-0,2 мл/кг живой массы
- КРС - 0,1-0,2 мл/кг живой массы

Пробиотические кормовые добавки

ПРОВАГЕН®

PROVAGEN®

Споровый термостабильный пробиотик

B.subtilis
B.licheniformis 10⁹ КОЕ/г



Применение:

для нормализации биоценоза кишечника, профилактики неспецифического иммунитета, профилактики технологического стресса.

Применяют перорально с кормом

Дозировки:

- Птица - 0,1-1 кг/т корма
- Свиньи - 0,1-1 кг/т корма
- КРС - 0,1-1 кг/т корма
- Лошади - 0,1-1 кг/т корма

ПРОВАГЕН КОНЦЕНТРАТ®

PROVAGEN CONCENTRATE®

Споровый водорастворимый пробиотик

B.subtilis
B.licheniformis 10¹¹ КОЕ/г



Применение:

для нормализации биоценоза кишечника, профилактики неспецифического иммунитета, профилактики технологического стресса.

Применяют перорально с водой в течение 3-20 дней

Дозировки:

- Птица - 0,15-1г/1000 гол.
- Свины- 0,01-0,1 г/гол.
- КРС - 0,05-0,3 г/гол.
- Лошади - 0,05-0,3г/гол.

ТРИОБАКТ

TRIOBAKT

B.licheniformis 5x10⁹ КОЕ/г



Применение:

для нормализации биоценоза кишечника, предотвращения последствий стрессовых воздействий, стимуляции неспецифического иммунитета и улучшения конверсии корма.

Применяют перорально с кормом

Дозировки:

- Птица - 500 г/т корма
- Свины - 500 г/т корма

Антистрессовый комплекс

АНТИСТРЕСС

ANTISTRESS

жиро и водорастворимые витамины,
аминокислоты, органические кислоты,
микро и макроэлементы



Применение:

для снижения отрицательного воздействия стрессов на организм животных и птицы.

Применяют перорально с водой или кормом

Дозировки:

- Птица - 0,2-1кг/т воды
0,2-2 кг/т корма
- КРС - 200-500 г/т воды
0,2-2 кг/т корма
- Свины - 0,2-1 кг/т воды
0,2-2 кг/т корма

Подкислитель

АЦИМАКС

ACIMAX

формат кальция 35%,
цитрат кальция 10%, пропионат кальция 14%,
бензойная кислота 9%, лактат кальция 1%,
сорбиновая кислота 1%, ацетат натрия 1%



Применение:

для микробиологической стабилизации кормов, применяемых в кормлении моногастрических животных и сельскохозяйственной птицы. Применяют для консервации и подкисления кормов и комбикормов.

Дозировки:

- Птица - 0,5-2,5 кг/т корма
- Свины - 1-3 кг/т корма

ГЕПАВИТ АКВА

HEPAVIT AQUA

L-карнитин 5% витамин B12 0,003%
 витамин B, 2% магний 2%
 витамин B, 0,8% бетаин 1,5%



Применение:

применяется для улучшения производственных показателей выращивания животных и птицы (сохранность, прирост массы тела), предупреждения и нормализации нарушений обмена веществ и повышения общей резистентности организма у животных, в том числе птицы

Дозировки:

- Птица - 0,5-2 л/т воды
- Свиньи - 1-2 л/т воды
- КРС - 5-10 мл/100 кг массы тела
- МРС - 1-2 мл/10 кг массы тела
- Лошади - 5-10 мл/100 кг массы тела

ОИЛСИД АКВА

OILCID AQUA

муравьиная кислота 50%
 пропионовая кислота 10%
 лимонная кислота 10%
 коричный альдегид, тимол, эвгенол



Применение:

кормовую добавку применяют свиньям и сельскохозяйственной птице для оптимизации процессов пищеварения, повышения эффективности использования кормов и улучшения производственных показателей выращивания.

Дозировки:

- Птица - 0,3-1 л/т воды
- Свиньи - 0,3-1 л/т воды

Биодеструктор навоза и помёта

БИОСАНВИТ-М

BIOSANVIT-M

бактерии рода бацилус (бацилус
 лихнинформис, бацилус паралихнинформис,
 бацилус сп) 10^7 КОЕ в 1 грамме продукта



Применение:

для санитарно-гигиенической обработки стоков, подстилок и животноводческих помещений, устранения неприятного запаха, подготовки мест содержания животных и птицы.

Дозировки:

- Птица - 50-70 г/т подстилки
- Свиньи - 25-200 г/м³ стоков
- КРС - 150-200 г/100 м² площади

Биоактиватор навоза и помёта

БИОСАНВИТ-С

BIOSANVIT-S

бактерии рода бацилус (бацилус
 лихнинформис, бацилус паралихнинформис,
 бацилус сп) 10^9 КОЕ в 1 грамме продукта



Применение:

для санитарно-гигиенической обработки стоков, подстилок и животноводческих помещений, способствует быстрому разложению органических отходов, устранению неприятного запаха, очистки сточных вод, подготовки мест содержания животных и птицы.

Дозировки:

- Птица - 0,5-0,7 г/т помета или твердых стоков
- Свиньи - 0,25-2 г/м³ стоков
- КРС - 0,5-0,7 г/т твердых фракций

Таблица совместимости антибиотиков

Взаимодействие антибиотиков при одновременном применении может оказывать как положительный, так и отрицательный результат. Информация, представленная в таблице, носит информационный характер.

	Азитромицин	Гентамицин	Доксициклин	Канамицин	Колистин	Левифлоксацин	Линкомицин	Неомицин	Нозигетид	Окситетрациклин	Паромомицин	Пенициллины	Салиномицин	Спектиномицин	Стрептомицин	Сульфадимидин	Сульфаниламиды	Тетрациклин	Тиамулин	Тилдипирозин	Тилмикозин	Тилозин	Триметоприм	Тулатромицин	Флорфеникол	Флюмеквин	Цефалоспорины	Цефтиофур	Ципрофлоксацин	Энрофлоксацин	Эритромицин
Азитромицин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Гентамицин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Доксициклин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Канамицин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Колистин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Левифлоксацин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Линкомицин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Неомицин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Нозигетид	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Окситетрациклин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Паромомицин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Пенициллины	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Салиномицин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Спектиномицин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Стрептомицин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Сульфадимидин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Сульфаниламиды	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тетрациклин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тиамулин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тилдипирозин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тилмикозин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тилозин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Триметоприм	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тулатромицин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Флорфеникол	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Флюмеквин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Цефалоспорины	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Цефтиофур	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ципрофлоксацин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Энрофлоксацин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Эритромицин	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



222660, Республика Беларусь Минская обл,
г. Столбцы, ул Задворьенская, 2
тел+375 44 591 0810; +375 1717 250 80
e-mail: info@stovek.org, korotkevich@stovek.org